



Alectinib (Alecensa) 安立適膠囊

150 mg/Cap | 民眾閱讀版 | 方麗華藥師撰

作用機轉

Alectinib (Zykadia) 為一異常 ALK 酪胺酸激酶抑制劑的第二代，干擾 ALK 酪胺酸酶的訊息傳遞，當 ALK 酪胺酸酶的傳訊受阻後，進而抑制癌細胞的增生，進一步達到抗腫瘤的效果。

致吐性及骨髓方面副作用


- 致吐性：低度致吐 (12 % 的病人服藥後會發生嘔吐)。
- 骨髓抑制程度輕：貧血 (56% · 3/4 級：2%)、淋巴細胞減少 (22% · 3/4 級：5%)。

注意事項及常見副作用

1. 心血管系統：水腫 (30%)、心跳過慢 (8% 至 18%)、肺栓塞 (1%)
2. 中樞神經系統：疲勞 (≤41%)、頭痛 (17%)
3. 皮膚系統：皮疹 (18%)，光敏感性皮膚病 (10%)

常見適應症


未經治療帶有陽性 ALK 基因的轉移性肺癌

- 
4. 內分泌&新陳代謝系統：高血糖（36%）、低血鈣症（32%）、血鉀過低（29%）、低磷血症（21%）、低血症鈉（20%）、重量增加（11%）
 5. 胃腸道消化系統：便秘（34%）、噁心（18%）、腹瀉（16%）、嘔吐（12%）
 6. 肝臟系統：血清 AST 升高（51%）、血清 ALP 鹼性磷酸升高（47%）增加、高膽紅素血症（39%）、血清 ALT 增加（34%）
 7. 神經肌肉及骨骼系統：肌酸磷酸酶（43%）增加、疲倦（≤41%）、肌痛（≤29%）、肌肉骨頭疼痛（≤29%）、背痛（12%）
 8. 腎臟系統：血清肌酸酐增加（28%）腎功能不全（8%）

註釋：癌症藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，會包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE，又稱常見毒性標準)，用於描述病人接受化療後，所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類，分為輕微（1 級）、中級（2 級）、嚴重（3 級）或致命（4 級）、死亡（5 級）。發生 3 級以上的副作用時，需醫療介入處理且進行劑量調整或停藥。4 級大多需要住院介入醫療處理。

藥師小叮嚀

1. 隨餐吞服整個膠囊；不要打開或溶解膠囊的內容物。如果服藥後出現嘔吐，不用額外再給；按時間等下一次的劑量。
2. 如有肌肉疼痛，請告知醫師。
3. 請測量心跳、血壓。
4. 應避免曝曬於太陽底下（在治療期間、及在最後一次使用 alectinib 的之後 7 天），用防曬霜和潤唇膏（SPF≥50）。
5. 間質性肺炎的症狀為持續咳嗽、呼吸困難及發



燒，如有發生此情形請盡速就醫。

6. 此藥可能會影響生育能力及胎兒發育，病人在用藥至停藥後 (男性 3 個月；女性 1 週) 應採有效避孕措施並避免哺乳。
7. 副作用等級 3/4 級即表示該副作用需要處理(調整藥物劑量與臨床處理)或住院接受治療。
8. 臨床監測: 肝腎功能、血糖、心臟(心電圖、心跳血壓)、
胸腔 X 光檢查。