



ENZALUTAMIDE (XTANDI) 安可坦膠囊

40 MG / CAP | 民眾閱讀版 | 方麗華藥師撰

常見適應症

- 前列腺癌。

作用機轉

ENZALUTAMIDE 是一個男性賀爾蒙受體的抑制劑，與其他抗男性賀爾蒙的不同在於較具有高度專一性。其會抑制雄性激素受體的基因轉譯，致使癌症細胞凋亡。

致吐性及骨髓方面副作用

無明顯症狀。

注意事項及常見副作用

1. 心臟血管方面副作用：四肢水腫 (12-15%)、高血壓(6-14%)可能需要降血壓之藥物治療)
2. 中樞神經副作用：疲勞 ($\leq 51\%$)、跌倒 (5-13%)、頭痛 (11-12%)、暈眩 (10-11%)、肌肉無力 (10%)、失眠 (8% to 9%)、焦慮 (7%)、感覺異常(7%)、周邊神經壓迫 ($\leq 7\%$)、脊椎壓迫 ($\leq 7\%$)、意識改變 (4% to 6%)、感覺遲鈍 (4%)、幻覺 (2%)、不寧腿症候群(2%)
3. 皮膚方面副作用：搔癢(4%)、皮膚乾燥(4%) 代謝及內分泌方面副作用：熱潮紅 (18-20%)、體重減輕(12%)、男性女乳症 (3%)
4. 胃腸方面副作用：便秘 (23%)、腹瀉 (17-22%)、食慾減低 (19%)、皮膚乾燥 (4%)
5. 血液方面副作用：血小板低下 (6%)
6. 肝臟方面副作用：黃疸 (3%)

7. 肌肉骨骼方面副作用：無力 ($\leq 51\%$)、背痛 (26-29%)、關節疼痛 (21%)、肌肉疼痛 (15%)、骨折 (4-9%)、僵硬(3%)(普拿疼可以緩解肌肉或骨頭不適)
8. 腎臟方面副作用：血尿 (7-9%), 頻尿 (5%)
9. 呼吸系統方面副作用：上呼吸道感染 (11-16%)、呼吸困難 (11%)、下呼吸道感染 (8-9%), 流鼻血 (3%)

註釋：當癌症藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，包括：藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀，或是當下併用的其他藥物的可能副作用。藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的常見毒性標準 (Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE)，常使用來描述病人接受化學治療後，所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類，分為輕微 (1 級)、中級 (2 級)、嚴重 (3 級)、致命 (4 級) 或死亡 (5 級)。當發生 3 級以上的副作用時，需醫療介入處理且進行劑量調整或停藥；若發生 4 級情形，大多需要住院介入醫療處理

藥師小叮嚀：

1. 一天一次，固定時間服用（飯前飯後皆可）。整粒吞服、勿咬碎，或打開膠囊。若錯過服藥時間，直接在下次服藥時間吃藥即可，不需補吃遺漏的劑量。
2. 接受 enzalutamide 治療的病人還應同時接受促性腺激素釋放激素類似物（或接受過雙側睪丸切除術）。
3. enzalutamide 與許多藥物有交互作用，請與藥師確認您目前所服用的藥物之間是否有相關的藥物交互作用。
4. 此藥可能會影響生育能力及胎兒發育，病人於服藥期間至停藥後 3 個月應採有效避孕措施。
5. 曾有癲癇發作之病人需小心使用 enzalutamide，如在使用期間有癲癇發作，需永久性的停止使用本藥品。
6. 可能會使血壓上升，增加心血管疾病的風險。請監測血壓。
7. 有骨折風險，注意骨密度變化。
8. 副作用等級 3/4 級即表示該副作用需要入院接受治療。
9. 臨床監測項目：定期監測血壓、PSA 指數。