

Tegafur/Uracil (UFT®)

優富多膠囊

100mg + 225mg /cap

民眾閱讀版 | 洪維宏藥師撰 方麗華藥師審



作用機轉

UFT 內含兩種成分，其中 Tegafur 是 5-FU 的前驅物質，在體內經化學作用以後會轉變為 5-FU，抑制腫瘤細胞生長。而 Uracil 會抑制將 5-FU 代謝的 dihydropyrimidine dehydrogenase，可使 5-FU 不會被快速代謝掉，延長 5-FU 在體內作用的時間

致吐性與血液方面副作用

- 致吐性：低度致吐 (有 10-30% 的病人會發生嘔吐)。
- 抑制血球生長程度：低度抑制。血小板減少 (1.1%)、白血球減少(3.1%)、貧血(0.8%)。

適應症

- 胃癌，
- 結腸癌，
- 大腸癌，
- 乳癌。
- 與 Cisplatin 併用治療轉移及末期肺癌，頭頸部癌。

注意事項及常見副作用

1. 骨髓抑制程度：白血球減少(3.1%)、血小板減少(1.1%)、貧血(0.8%)。
2. 心血管方面副作用：低血壓(6%)、心絞痛(<0.1%)、心律不整。
3. 皮膚方面副作用：掉髮(≤5%)、皮疹(≤5%)、指甲異常(≤5%)、色素沈澱(≤5%)。
4. 胃腸方面副作用：噁心及嘔吐(2.4%)、口腔黏膜破損(4-26%)、腹瀉(1.5%)、厭食(≤5%)
5. 肝臟方面副作用：肝功能指數升高(≤5%)。
6. 骨骼肌肉方面副作用：關節痛(<0.1%)。
7. 神經系統副作用：頭痛、眩暈(≤5%)、倦怠感(≤5%)、意識障礙、無方向感(<0.1%)。
8. 腎臟方面副作用：腎功能指數升高(≤5%)、蛋白尿(<0.1%)、血尿(<0.1%)、急性腎衰竭(<0.1%)。
9. 呼吸系統副作用：呼吸困難、間質性肺炎(<0.1%)

註釋：癌症藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。

藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE, 又稱常見毒性標準), 用於描述病人接受化療後，所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類，分為：輕微(1級)、中級(2級)、嚴重(3級), 或致命(4級)、死亡(5級)。發生3級以上的副作用時，需醫療介入處理且進行劑量調整或停藥。4級大多需要住院介入醫療處理。

藥師小叮嚀

1. 通常一天二到三次，固定時間服用，若錯過服藥時間，想起來的時間在下次給藥時間與本次給藥時間的一半以內可以補吃劑量，若超過則直接在下次服藥時間吃藥即可，不需補吃遺漏的劑量。
2. 無法吞服膠囊或管灌之病人，可以將一顆膠囊放入 35°C 60ml 的溫水中，靜置 3~5 分鐘，等膠囊外殼開始釋出藥物後，開始搖晃容器 5 分鐘，使膠囊內藥物均勻分散在溶液中成懸浮液。因為膠囊外殼無法完全溶解，且藥物沉降快。
3. 如有使用其他藥物，請藥師檢查是否有藥物之間交互作用。
4. 孕婦或可能懷孕的婦女禁止投與本劑。
5. 婦女使用此藥時不可以哺乳，須等待至停藥 2 周後才可進行哺乳。
6. 高齡者的生理機能較低，特別是易有消化道發炎（腹瀉、口內炎）及骨髓抑制情形，應密切觀察患者的狀態並慎重投與。
7. 副作用等級 3/4 級即表示該副作用需要回診或入院接受治療。
8. 臨床監測項目: 全血球計數、腎功能、肝臟功能。