

Palbociclib (Ibrance®) 愛乳適膠囊

125 mg/cap | 民眾閱讀版 | 方麗華藥師撰



作用機轉

Palbociclib 為一種蛋白磷酸激酶抑制劑 (kinase inhibitor)，能選擇性抑制 CDK4/6 這種蛋白磷酸激酶。在某些癌細胞中 CDK4/6 會被過度活化，擾亂細胞週期而導致癌細胞不斷複製增生，若用 Palbociclib 阻止 CDK4/6 則可以抑制癌細胞增生。

常見適應症


晚期或轉移性乳癌

致吐性及骨髓方面副作用

- 低致吐性 (即若未給止吐藥預防，有10-30%的病人會發生嘔吐)。
- 抑制血球生長程度：血球低下 (43-53%，第 3/4 級 19-30%可能需醫療介入)、嗜中性球低下 (75-83%，第 3 級 48-55%、第 4 級 6-11%可能需醫療介入)、貧血 (30-35%，第 3/4 級 5%可能需輸血)、血小板低下 (17-23%，第 3/4 級 2%可能需輸血小板)。

注意事項及常見副作用

- 胃腸道副作用：食慾減退 (15%至16%)，腹瀉 (24%至26%；3級：1%)，噁心 (34%至35%；3級：



- <1%) · 口腔潰瘍 (28%至30% ; 3級 : 1%) · 嘔吐 (16%至19% ; 3級 : 1%)
- 神經系統副作用：虛弱 (8%至17%)、疲勞 (37%至41%)
- 皮膚方面副作用：掉髮 (18%至33%)、皮疹 (17%至18%)、皮膚乾燥 (6%至12%)
- 肝臟系統副作用：血清丙氨酸轉氨酶升高 (GPT, 6%至43%)、血清天門冬氨酸轉氨酶升高 (GOT, 8%至52%)
- 免疫系統副作用：感染 (47-55%)
- 呼吸系統副作用：上呼吸道感染 (31%)、鼻血 (7-11%)
- 其他副作用：發燒 (13%)

註釋：癌症藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，會包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE，又稱常見毒性標準)，用於描述病人接受化療後，所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類，分為輕微(1級)、中級(2級)、嚴重(3級)或致命(4級)、死亡(5級)。發生3級以上的副作用時，需醫療介入處理且進行劑量調整或停藥。4級大多需要住院介入醫療處理。

藥師小叮嚀

1. 本藥品需與食物併服，亦可和牛奶併服。避免與葡萄柚並用，會增加血中濃度而增加臨床毒性。
2. 此藥品膠囊需整粒吞服，請不要將膠囊剝開、磨粉、咀嚼。
3. 請將此藥儲存於室溫陰涼乾燥處 (20-25 °C)。
4. 若忘記服藥或服藥後嘔吐，就直接待下次服藥時間再服用下一次的藥量即可。(千萬不要一次吃雙倍藥量！)
5. 如有使用其他藥物，請藥師檢查是否有藥物交互作用。
6. 若您服藥期間發現有以下的症狀出現，請立即與您的醫師聯繫：
 - 感染徵象：發燒、畏寒、咳嗽、鼻水/鼻涕、喉嚨



痛、各種疼痛

■ 肺部症狀：喘、胸痛、呼吸困難、咳血

■ 過敏：蕁麻疹、臉或手發生紅或腫、喉嚨或嘴巴紅腫刺痛、胸口緊、呼吸困難

■ 心悸、呼吸急促、暈眩、畏光頭痛、異常出血、瘀青、虛弱、四肢無力

7. 若您服藥期間發現有以下的症狀出現，請於下次回診時告知醫師：

■ 頭痛、噁心、疲倦

■ 嘴唇、口腔或喉嚨有紅腫或白斑

8. 本藥品有可能對胎兒造成傷害，因此並不適用於懷孕婦女，女性病人於服藥期間至停藥後至少3週內皆應採有效避孕措施並避免哺乳；男性病人於服藥期間至停藥後至少3個月內皆應採有效避孕措施。

9. 副作用等級3/4級即表示該副作用需要處理(調整藥物劑量與臨床處理)或住院接受治療。

10. 臨床監測: 全套血球計數。